

Analgośedacja (znieczulenie)

Informacje dla Pacjenta

Analgośedacja - jest to działanie mające na celu zniesienie lęku, czucia bólu oraz wywołanie uspokojenia. Jest stosowana w czasie badań endoskopowych w celu zwiększenia komfortu pacjenta.

Jak się przygotować do analgośedacji?

- Przez 6 godzin przed badaniem nic nie jedz.
- Przez 2 godziny przed badaniem nic nie pij.
- Przez 2 godziny przed badaniem nie pal papierosów, nie żuj gumy.
- Leki przyjmowane na stałe, przyjmij zgodnie z dotychczasowymi zaleceniami.

Uwaga:

- **Leki przeciwcukrzycowe:**
 - Dzień przed badaniem, ani w dniu badania **nie przyjmuj metforminy** (Metformax, Siofor, Glucophage, Avamina, Formetic, Diabufor, Etform).
 - Insulina – skonsultuj przygotowanie do badania z lekarzem prowadzącym.
- W dniu badania proszę **nie kremować/balsamować klatki piersiowej** (w to miejsce naklejane są elektrody do monitorowania czynności serca w trakcie analgośedacji).
- W dniu badania proszę **nie kremować/balsamować rąk** (w to miejsce zakładany jest wenflon do żyły w celu oddania leków).
- W dniu badania zapraszamy **bez makijażu**.

Co ze sobą przynieść?

- Listę leków i informacje o sposobie dawkowania.
- Kopię dokumentacji medycznej: wyniki badań diagnostycznych i wypisy ze szpitala.
- Jeżeli używasz okularów do czytania – zabierz je ze sobą.

W co się ubrać?

- Ubranie powinno być luźne.
- Proszę ubrać podkoszulek lub T-shirt tak by w trakcie badania pozostać w ubraniu z krótkim rękawem.
- Buty muszą być na płaskiej podeszwie. Prosimy nie ubierać szpilek, koturnów itp.

Analgośedacja (znieczulenie)

Informacje dla Pacjenta

Z kim przyjsć na badanie?

- W przypadku badań w analgośedacji **konieczne jest przyjsć z osobą towarzyszącą** (w celu zaopiekowania się Tobą po analgośedacji). Osobą towarzyszącą nie jest:
 - Dziecko.
 - Osoba upośledzona ruchowo.
 - Osoba upośledzona intelektualnie.
 - Osoba, która tego samego dnia miała wykonywane badanie w analgośedacji.



Uwaga:

Zgłoszenie się bez osoby towarzyszącej może skutkować nie wykonaniem analgośedacji do zaplanowanego badania endoskopowego.

Co zrobić po badaniu?

- Przez 24 godziny po zakończeniu analgośedacji **nie możesz prowadzić pojazdów mechanicznych**, roweru, hulajnogi.
- Przez 24 godziny po zakończeniu analgośedacji nie powinieneś podpisywać urzędowo ważnych dokumentów, wracać do pracy, nie korzystaj z internetowej bankowości itp.



Przed badaniem w analgośedacji niezbędne będzie zapoznanie się i podpisanie zgody na zabieg, dlatego prosimy o przybycie 30 minut przed wyznaczonym terminem badania.

Wyznaczona godzina badania może ulec przesunięciu.