

Tympanometria

Informacje dla Pacjenta

Tympanometria to nieinwazyjne, obiektywne badanie pozwalające stwierdzić ruchomość błony bębenkowej i uzyskać informacje dotyczące patologii ucha środkowego.

Jak przebiega badanie?

Tympanometria jest mało skomplikowanym, szybkim badaniem. Całą procedurę trwa kilka minut. Badanie wykonuje się osobno dla prawego i lewego ucha. Badanie polega na wprowadzeniu do ucha sondy z zaślepką, która uszczelnia kanał słuchowy. Sonda podłączona jest do tak zwanego tympanometru. Urządzenie to generuje bodźce dźwiękowe oraz zmienia wartości ciśnienia, jednocześnie rejestrując wychylenia błony bębenkowej.

Badanie jest bezbolesne, aczkolwiek czasami może być nieprzyjemne w związku ze zmianami ciśnienia w przewodzie słuchowym.

Wyniki tympanometrii są dostępne od razu.

Jak się przygotować?

Przed badaniem konieczne jest dokładne oczyszczenie uszu z zalegającej woskowiny.

Na dwa dni przed badaniem konieczne jest zaprzestanie stosowania preparatów w sprayu/płynie.

Na 3 dni przed badaniem nie należy korzystać z basenu i należy ograniczyć wszystkie czynności, które mogą spowodować zamoczenie/zaleganie wody w przewodach słuchowych.

Do badania można przystąpić wyłącznie w momencie, gdy uszy są suche i czyste.

Na badanie należy zabrać skierowanie w wersji papierowej lub wersji elektronicznej

Czy są jakieś przeciwwskazania?

- Woskowina lub ciało obce w przewodzie słuchowym,
- Brak błony bębenkowej lub widoczna perforacja
- Zabieg chirurgiczny ucha w ciągu 6 tygodni poprzedzających badanie
- Badania nie zaleca się u niemowląt poniżej 7 miesiąca życia

Badanie można wykonywać u pacjentów w każdym wieku (także u małych dzieci), nawet z różnego rodzaju chorobami przewlekłymi.