



USG jamy brzusznej u dorosłych

Informacje dla Pacjenta

USG jamy brzusznej jest najczęściej wykonywanym badaniem diagnostycznym. Dzięki jego przeprowadzeniu można ocenić stan narządów jamy brzusznej (wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, nerek, trzustki, śledziony, aorty i dużych naczyń krwionośnych, pęcherza, gruczołu krokowego, macicy i przydatków). Wykonanie badania pozwala na zdiagnozowanie obecności płynu w jamie brzusznej, stwierdzenie, czy dany narząd uległ powiększeniu, oraz ustalenie źródła odczuwanego bólu.

Jak się przygotować?

Na badanie musisz przyjść **na czczo**:

- **Po południu i wieczorem, w dzień poprzedzający badanie, unikaj przyjmowania pokarmów i płynów wzdymających (napojów gazowanych, jogurtów itp.), a jeśli masz tendencję do wzdęć, stosuj lekkostrawną dietę już 2 dni przed badaniem.**
 - W dniu poprzedzającym badanie przyjmij Simetigast Forte (1 kapsułkę wieczorem i 1 kapsułkę rano w dniu badania) lub Espumisan (3 razy dziennie po 3–4 kapsułki). Są to środki odgazowujące, dostępne w aptece bez recepty.
 - Przynajmniej przez **6 godzin** przed badaniem nie możesz nic jeść, ale możesz wypić niewielką ilość niegazowanej wody, małymi porcjami i bez nadmiernego połykania powietrza.
 - Nie żuj gumy i nie pal papierosów.
-

Leki

Jeśli przyjmujesz na stałe leki, weź je zgodnie z zaleceniem lekarza, popijając niegazowaną wodą, ale **nie później niż godzinę przed badaniem**.





Co ze sobą przynieść?

Poprzednie wyniki badań diagnostycznych i laboratoryjnych oraz wypisy ze szpitala (jeśli pobyt miał związek z badaniem).

.....

Jak przebiega badanie?

- Badanie jest całkowicie bezbolesne i wykonywane w pozycji leżącej na plecach.
- Podczas badania lekarz smaruje powłoki brzuszne specjalnym żelem, który ułatwia przenikanie fali akustycznej przez skórę.
- Po badaniu możesz wytrzeć resztki żelu ręcznikiem papierowym, aby nie zamoczyć ubrania.

