

Rezonans magnetyczny miednicy mniejszej

Informacje dla Pacjenta

Rezonans magnetyczny miednicy mniejszej w diagnostyce endometriozy to specjalistyczne badanie obrazowe wykorzystujące nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego pole magnetyczne i fale radiowe do uzyskania szczegółowych obrazów narządów miednicy. Badanie jest nieinwazyjne i nie wykorzystuje promieniowania jonizującego. Rezonans magnetyczny pozwala na ocenę macicy, jajników, jajowodów, pochwy, pęcherza moczowego, jelit oraz innych struktur miednicy mniejszej pod kątem występowania ognisk endometriozy. Badanie jest szczególnie przydatne w ocenie endometriozy głęboko naciekającej oraz planowaniu leczenia operacyjnego. Czas badania wynosi zwykle od 30 do 60 minut.

Jak się przygotować?

- Na 4–6 godzin przed badaniem należy pozostać na czczo, tj. nie spożywać pokarmów. Dopuszczalne jest picie niewielkich ilości niegazowanej wody.
- W dniu badania należy przyjąć leki stosowane przewlekłe zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.
- Na około 1 godzinę przed badaniem należy opróżnić pęcherz moczowy, a następnie nie oddawać moczu do czasu wykonania badania. Pęcherz powinien być umiarkowanie wypełniony.
- W niektórych przypadkach, szczególnie przy podejrzeniu zajęcia jelita przez endometriozę, mogą być wymagane dodatkowe zalecenia dotyczące przygotowania jelit. Informacja o konieczności takiego przygotowania zostanie przekazana indywidualnie.
- Na badanie proszę zgłosić się w wygodnym ubraniu pozbawionym metalowych elementów, takich jak guziki, klamry czy zamki błyskawiczne.
- Przed wejściem do sali badań należy zdjąć i pozostawić wszelkie metalowe przedmioty: biżuterię, zegarki, okulary, aparaty słuchowe, telefony komórkowe, karty płatnicze, spinki do włosów oraz inne elementy metalowe.
- Badanie może być wykonane niezależnie od dnia cyklu miesięczkowego.
- W celu poprawy jakości obrazów podczas badania może zostać podany lek ograniczający ruchy jelit (perystaltykę). O możliwości jego zastosowania decyduje personel medyczny po ocenie przeciwwskazań.
- Ze względu na prawidłową ocenę radiologiczną w pojedynczych przypadkach może być wymagane podanie dożylnego środka kontrastowego. Decyzję o jego zastosowaniu podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie.

Każdorazowo decyzję o podaniu środka kontrastowego podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie, w oparciu o dane medyczne. W przypadku konieczności podania kontrastu, usługa może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Co ze sobą przynieść?

- aktualne skierowanie na badanie lub numer e-skierowania
- dokument tożsamości
- poprzednie wyniki badań obrazowych dotyczących endometriozy lub schorzeń ginekologicznych (USG, MR, TK, opisy badań oraz płyty CD)
- dokumentację dotyczącą przebytych zabiegów i operacji ginekologicznych
- Pacjenci ze względными przeciwwskazaniami do badania MR są zobowiązani przed wykonaniem badania dostarczyć do Pracowni MR kompletną dokumentację medyczną dotyczącą zastosowanego leczenia, wraz z opisem typu zastosowanego implantu, a w szczególności identyfikacją materiału, z jakiego został wykonany, oraz powiadomić o powyższym personel pracowni.
- osoby niepełnoletnie zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym legitymującym się dokumentem potwierdzającym sprawowanie opieki.

Rezonans magnetyczny miednicy mniejszej

Informacje dla Pacjenta

Prosimy o zgłoszenie się na wizytę 15 minut wcześniej, w celu wypełnienia przed badaniem ankiety medycznej.

Czy są jakieś przeciwwskazania?

- **Bezwzględne** (nie wykonujemy badania): niektóre implanty ślimakowe, niekompatybilne z rezonansem magnetycznym implanty elektroniczne oraz metaliczne ciała obce stanowiące przeciwwskazanie do badania.
- **Względne** (badanie MR może być wykonane pod szczególnymi warunkami, zawsze do decyzji lekarza nadzorującego badanie, w oparciu o dokumentację medyczną): ciąża, stenty, klipsy naczyniowe

Sporadycznie, w niektórych badaniach wymagane są dodatkowe ograniczenia. O tych różnych dodatkowych ograniczeniach informujemy pacjentów indywidualnie – kontaktując się z nimi telefonicznie, a jeśli jest to nieskuteczne, to za pomocą sms.

W trakcie badania:

- Jeżeli do badania potrzebne będzie podanie dożylnie środka kontrastowego, konieczne będzie wkłucie do żyły i założenie wenflonu.
- Podczas badania wymagana jest pełna współpraca z personelem medycznym, m.in. leżenie w bezruchu, ponieważ ma to wpływ na jego jakość. Artefakty ruchowe mogą ograniczyć wartość diagnostyczną badania.
- Podczas badania, pomimo zamknięcia, będzie Pan/Pani miał stałą możliwość kontaktu z personelem pracowni.

Po badaniu:

- Po badaniu z podaniem środka kontrastowego, kobieta karmiąca piersią, nie powinna karmić dziecka przez 24h, a ściągnięty w tym czasie pokarm powinien zostać wylany.
- Po podaniu środka kontrastowego pacjent pozostanie w placówce, pod obserwacją personelu, przez ok 30 min.
- Po badaniu w sedacji (uśpieniu) pacjent pozostanie w placówce, pod obserwacją personelu, przez minimum 30 min.
- Założony wenflon zostanie usunięty przed opuszczeniem placówki.